

## Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2016. július 14-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
		Őszibúza		0,01*		A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vetés után kelésig (BBCH 00-09), 1 leveles állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 10-13)</b>
		Ősziarpa		0,01*		A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vetés után kelésig (BBCH 00-09), 1 leveles állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 10-13)</b>
	Boxer	gyomirtó szer	proszulfokarb burgonya	0,01*	-	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>ültetés után, 5 cm-es hatás magasságig (BBCH 00-12)</b>
		Díszfaiskola (túja, tiszafa, boróka és hamisciprus) 1 évesnél idősebb				A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>kultúrnövénynyugalmi állapotában</b>
		napraforgó		0,02*		A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vétés után kelés előtt (preemergensen) (BBCH 00-08)</b>

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2016. július 14-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
		sárgarépa		1	60	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vétés után, kelés előtt</b> <b>(BBCH 00-03) vagy</b> <b>2 leveles állapottól 4</b> <b>leveles állapotig</b> <b>(BBCH 12-14)</b>
	Boxer	gyomirtó szer	proszulfokarb gyökérpetrezselyem	0,08	60	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vétés után, kelés előtt</b> <b>(BBCH 00-03) vagy</b> <b>2 leveles állapottól 4</b> <b>leveles állapotig</b> <b>(BBCH 12-14)</b>
			gumós zeller	0,08	60	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>zellerpalánták kiültetése után</b> <b>(BBCH 12-14)</b>
			lóbab	0,01*	Eltörás szerinti felhasználás esetén élelmézes-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vétés után, kelés előtt</b>
			lencse	0,01*		A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vétés után, kelés előtt</b>

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2016. július 14-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
		csillagfűrt (fehér virágú)		0,01*		A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>vétés után, kelés előtt</b>
		pöréhagyma		0,01*	Előírás szerinti felhasználás esetén	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>2. levél megjelenésétől 4. levél megjelenéséig (BBCH 12-14)</b>
	Boxer	gyomirtó szer	proszulfokarb Kamilla	2	élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>a kultúrnövény hajtásainak 5-10 cm-es nagyságánál</b>
		francia tárkony		20		A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>palánták kiültetését követő évtől tavasszal, nyugalmi állapotban vagy a betakarítás után, az újrahatást megelőzzen</b>
		vöröshagyma		0,03	60 nap	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): <b>2. levél megjelenésétől 4. levél megjelenéséig (BBCH 12-14)</b>

\* Analitikai kimutathatóság alól határat mutatja