

A molyspecialista kukoricában.

Kíméletlen a hernyókhöz, kíméletes a beporzó rovarokhoz



Hosszú tartamhatás



Méhekre nem jelölésköteles



Rugalmas felhasználhatóság

A klorantraniliprol rianodin a receptor gátló rovarölőszerek **első és legjelentősebb képviselője**.

Hatóanyag tartalma 200 g/l.

Megjelenése áttörést hozott a rovarölőszerek között. **A hernyókártevők minden fejlődési alakja ellen hatékony, kiemelkedő tojásölő hatású.**

- Rugalmasan illeszthető a kukorica védelmére, tojásrakást követően kijuttatva **a tojásból kikelő lárvákat már elpusztítja**, így a hernyók nem képesek berágni a szárba vagy a csőbe.
- Egy szezonban **akár két alkalommal is kijuttatható**.
- Előnye, hogy méhekre nem jelölésköteles, így a kukorica virágzásakor és utána akár sárgaérés állapotáig kijuttatható.
- Élrelmezés-egészségügyi várakozási ideje takarmánykukoricában 14 nap, csemegekukoricában 10 nap.
- Takarmány- és vetőmag-előállításban sárgaérésig (BBCH 87), míg csemegekukoricában szemfejlődés kezdetéig (BBCH 71) lehet használni.
- **Dózisa 100-150 ml/ha.** Erős rajzás vagy fertőzés esetén a magasabb dózist használjuk.

A kijuttatást rajzásfigyelésre, előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálatra alapozva), **magas 400 l/ha lémenyiséggel végezzük.** Légi kijuttatása nem engedélyezett.

A Voliam kukoricabogár imágók ellen nem határos, **erős kukoricabogár imágó jelenlét esetén egészítsük ki Karate Zeon rovarölőszerral vagy használjuk a gyári kombinációt, az Ampligo-t.** A készítményhez nedvesítő szer hozzáadása javasolható (pl. Fix-Pro vagy Eucarol Plus).

Gyapottok bagolylepke kártétele kukoricán




Kukoricamoly lárvája kukorica szárán

KULTÚRA	KÁROSÍTÓ	KEZELÉSEK SZÁMA	KEZELÉSEK KÖZÖTTI MIN. IDŐ (nap)	DÓZIS (kg/ha)	VÍZ (l/ha)	UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA	É.V.I. (nap)
Kukorica (takarmány, vetőmag előállítás)	kukoricamoly, bagolylepke hernyók	2	14	100-125 125-150	400 - 1000	sárgaérés (BBCH 87)	14
Kukorica (csemege)						Szemfejlődés kezdete (BBCH 71)	10
Burgonya	burgonya-bogár	2	14	50-60	300-500	Virágzás (BBCH 60)	28

A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerral



Kukoricamoly elleni hatékonyság (Apátfalva, 2021)



A hernyókártevők minden fejlődési alakja ellen hatékony, kiemelkedő tojásölő hatású.

- Fertőzött növény %
- Lárva/növény
- Lyuk/növény
- Törött szár %